

# НАРКОСТОП

## Кокайн

Каталоговый номер W 10-S

НАРКОСТОП на кокайн представляет собой однотестовую экспресс-систему для качественного определения кокaina и его основных метаболитов в моче пациента при наличии определенной пороговой концентрации.

Только для применения *in vitro*.

### НАЗНАЧЕНИЕ

НАРКОСТОП на кокайн фирмы Wondfo предназначен для определения бензодиазепинов в моче человека путем иммунохроматографического анализа. Чувствительность определения для кокaina составляет 200 нг/мл. Данное исследование является качественным и предварительным. Для подтверждения полученного результата рекомендуется использование дополнительных химических методов. Предпочтение отдается газовой хроматографии/масс-спектрометрии (GC/MS, GC/ICP). При применении теста на определение любого наркотического вещества следует учитывать также клинические данные и профессиональную оценку ситуации в целом, особенно при получении положительных первичных результатов.

### ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Кокайн является производным листьев растения коки и представляет собой мощный стимулятор центральной нервной системы и локальный анестетик. Среди физиологических эффектов кокaina выделяются эйфория, чувство самоуверенности и энергичность, сопровождающие повышением частоты сердечных сокращений, расширением зрачков, лихорадкой, трепетом и повышенным потоотделением. Кокайн выводится с мочой в основном в виде бензойлекгонина в течение короткого периода времени.

### ПРИНЦИП РАБОТЫ ТЕСТА

НАРКОСТОП на кокайн фирмы Wondfo представляет собой конкурирующий иммунохроматический тест, используемый для скрининга наличия кокaina в моче. Имеет вид хроматографической абсорбционной системы, в котором кокайн и его метаболиты в образце конкурентно взаимодействуют с ограниченным числом мест связывания на конъюгате, окрашенном антителами.

При погружении абсорбирующего конца тестовой системы в образец мочи, моча подвергается капиллярной абсорбции, смешивается с окрашенными антителами конъюгатом и растекается вдоль покровной мембрани. Если концентрация наркотического вещества находится на уровне пороговой или выше, свободные молекулы связываются с окрашенными антителами конъюгатом, предотвращая связывание последнего с комплексом наркотическое вещество-белок в реакционной зоне. Это предотвращает появления четкой окрашенной полоски в реакционной зоне, что указывает на возможный положительный результат.

Если концентрация наркотического вещества в образце равна нулю или ниже пороговой (чувствительности теста), окрашенный антителами конъюгат связывается с комплексом наркотическое вещество-белок, зафиксированным в реакционной зоне. Это приводит к появлению цветной тестовой полоски, которая, вне зависимости от интенсивности окрашивания, указывает на отрицательный результат.

Для контроля проведения теста, в том случае, если тест был выполнен правильно, в контрольной зоне появляется контрольная полоска.

### ВНИМАНИЕ

1. Только для наружного применения. Не глотать.
2. Выбрасывать сразу после использования. Не использовать повторно.
3. Не использовать по истечении срока годности.
4. Не использовать при надрыве или нарушении целостности упаковки.
5. Беречь от детей.
6. Не интерпретировать тест по истечении 5 минут.

### СОСТАВ НАБОРА

1. Упаковка содержит тестовую систему и влагоголотитель. Влагоголотитель не обходим для хранения продукта и не используется для проведения теста.
2. Одна инструкция по применению на 100 наборов.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре 4 ~30°C в целой упаковке до истечения срока годности. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей, влаги или высокой температуры.  
НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ.

### СБОР И ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦА

Собрать образец мочи в стакан для сбора мочи. Образцы мочи можно хранить в холодильнике (2-8° C) до сорока восьми часов. Для более длительного хранения, образцы следует заморозить (-20° C и ниже).


Перед проведением теста замороженные или сохраненные в холодильнике образцы следует разморозить при комнатной температуре. Для проведения теста используется необходимое количество мочи.

### ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТА

Тест следует проводить при комнатной температуре (от 18° C до 30° C).

1. Достаньте тестовую полоску из герметичной упаковки.
2. Погрузите полоску в мочу таким образом, чтобы напечатанная на полоске стрелка указывала в сторону мочи. Извлеките полоску через три секунды и положите на чистую, сухую, невпитывающую поверхность (например, устье контейнера для сбора мочи).
3. Оцените результаты в течение пяти минут. По истечении указанного времени результат не является достоверным.

**ВАЖНО:** следите за тем, чтобы уровень мочи не превышал отметки MAX (показана линией), иначе результат теста может оказаться ошибочным.



### ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ

#### Положительный (+)

В контрольной зоне определяется ярко-розовая полоска. В тестовой зоне цветная полоска отсутствует. Это указывает на наличие соответствующего наркотического вещества в специфической тестовой зоне.


#### Отрицательный (-)

Ярко-розовая полоска определяется в контрольной и соответствующей тестовой зонах. Это указывает на то, что концентрация соответствующего наркотического вещества в специфической реакционной зоне равна нулю или ниже пороговой.

#### Дефектный

Если цветная полоска не определяется в контрольной зоне или определяется только в тестовой зоне, тест проведен некорректно. Для повторного теста следует использовать другую тестовую систему. Пожалуйста, свяжитесь с торговым представителем, у которого вы приобрели тестовую систему, и сообщите ему серийный номер.

**Внимание:** Интенсивность цвета или ширина полоски не имеют значения в оценке результатов теста.



Положительный



Отрицательный



Дефектный



Дефектный

### КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Несмотря на наличие внутренней системы контроля в виде полоски в контрольной зоне, для подтверждения результатов теста и верификации правильного его проведения, рекомендуется использование внешних систем контроля. Положительный и отрицательный контроль должны давать ожидаемые результаты. Положительные результаты тестирования должны быть подтверждены дополнительными методами, такими как GC/MS.

### ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Данный тест разработан только для оценки образцов мочи. Не предназначен для использования других биологических образцов.
2. Наличие примесей в образцах мочи может приводить к неправильным результатам. Активные окислители, например, хлорная известь (гипохлорит) могут окислять анализируемое наркотическое вещество. Если имеются подозрения на наличие примесей в образце мочи, следует собрать другой образец.
3. Данный тест является качественным и скрининговым. Не предназначен для количественного определения концентрации наркотического вещества и степени интоксикации.

## РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### A. Чувствительность

НАРКОСТОП на кокайн имеет порог определения образцов как положительных в 200 нг/мл для бензойлекгонина как эталона. Доказано, что тестовая система определяет наличие кокaina в моче при концентрации выше, чем 200 нг/мл, в течение 5 минут.

### B. Специфичность и перекрестная реактивность

Для оценки специфичности теста, тестовая система использовалась для определения кокaina, его метаболитов и других соединений того же класса, которые вероятно присутствовали в образцах мочи. Все соединения добавлялись к нормальной моче человека, с нулевой концентрацией наркотических веществ. Приведенные ниже концентрации также отражают ограничения определения специфических наркотических веществ или метаболитов.

Соединение	Концентрация (нг/мл)
Benzoylecgone	200
Cocaine HCl	750
Cocathylene	12,500
Ecgone	32,000

### C. Конкурирующие соединения

Принимая во внимание сложный химический состав клинических образцов мочи и возможность присутствия в них потенциально конкурирующих соединений, в частности, ацетоуксусной кислоты, ацетона, альбумина и др., аналогичные ситуации были симулированы путем последовательного добавления в образец потенциально конкурирующих соединений в известной концентрации. Приведенные ниже вещества в концентрации 100 мкг/мл не проявили перекрестной активности при использовании НАРКОСТОПа на кокайн.

4-Acetamidophenol	Lebetanol
Acetophenetidin	Loperamide
N-Acetylprocainamide	Maprotiline
Acetysalicilic	Meperidine
Aminopyrine	Meprobamate
Amityline	Methadone
Amobarbital	Methoxyphenamine
Amoxicillin	(+)-3,4-Methylenedioxymphetamine
Ampicillin	(+)-3,4-Methylenedioxymethamphetamine
L-Ascorbic Acid	Nolidixic acid
D,L-Amphetamine	Nalorphine
Apomorphine	Naloxone
Aspartame	Naltrexone
Atropine	Naproxen
Benzillic acid	Niacinamide
Benzoic acid	Nifedipine
Benzylecgone	Norethindrone
Benzphetamine	D-Norpropoxyhene
Bilirubin	Noscapine
(+) Chlorpheniramine	D,L-Octopamine
Caffeine	Oxalic acid
Cannabidiol	Oxolinic acid
Chlorhydrate	Pentobarbital
Chloramphenicol	Perphenazine
Chlorthiazide	Phencyclidine
(+) Chlorpheniramine	Phenelzine
Chlorpromazine	Phenobarbital
Chlorquine	Phentermine

Cholesterol	L-Phenylephrine
Clomipramine	$\beta$ -Phenylethylamine
Clonidine	Phenilpropanotamine
Cocaine hydrochloride	Prednisone
Cortisone	D,L-Propanolol
(-) Cotinine	D-Propoxyphene
Creatinine	D-Pseudoephedrine
Dextromethorphan	Quinine
Diclofenac	Ranitidine
Difunisal	Salicylic acid
Diaoxin	Secobarbital
Diphenhydramine	Serotonin
Doxylamine	Sulfamethazine
Ecgone hydrochloride	Sulindac
Ecgone methylester	Tetrahydrocortisone,3 Acetate
(-)- $\Psi$ -Ephedrine	Tetrahydrocortisone, (5-D glucoronide)
Fenoprofen	Tetrahydrozoline
Furosemide	Thiamine
Gentisic acid	Thioridazine
Hemoglobin	D,L-Tyrosine
Hydrocortisone	Tolbutamine
O-Hydroxyhippuric acid	Triamterene
p-Hydroxymethamphetamine	Trifluoperazine
3-Hydroxytyramine	Trimethoprim
Ibuprofen	Tryptamine
Imipramine	D,L-Tryptophan
Iproniazid	Tyramine
(+) Isoproterenol	Uric acid
Isoxsuprine	Verapamil
Ketamine	Zomepirac
ketoprofen	

## РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Baselt, R.C. Disposition of Toxic Drugs and Chemicals in Man. Biomedical Publications, Davis, CA, 1982.
- Ellenhorn, M.J. and Barceloux, D. G Medical Toxicology. Elservier Science Publishing Company, Inc., New York, 1988
- Gilman, A. G., and Goodman, L. S. The Pharmacological Fluids, in Martin WR(ed): Drug Addiction I, New York, Spring – Verlag, 1977.
- Harvey, R.A., Champe, P.C. Lippincott's Illustrated Reviews. Pharmacology. 91-95, 1992.
- Hawwks RL, CN Chiang. Urine Testing for drugs of Abuse. National Institute for Drug Abuse (NIDA), Research Monograph 73, 1986.
- Hofmann F.E., A Handbook on Drug and Alcohol Abuse: The Biomedical Aspects, New York, Oxford University Press, 1983.
- McBay, A. J. Clin. Chem. 33,33B-40B, 1987.

## ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ

	См. инструкцию по применению		Количество тестов в наборе		Дата изготовления
	Только для диагностики in vitro		Срок годности		Вторично не использовать
	Хранить при температуре 4–30° C		Серийный номер		Каталоговый номер
	Тестовая кассета		Стакан для сбора мочи		Влагопоглотитель
	Положительный		Отрицательный		Дефектный
	Хранить вдали от света/влаги		Пипетка		



Производитель Guangzhou  
Wondfo Co., Ltd.  
Wondfo Sciente Park  
South China Univ. of Technology  
Guangzhou 510641 China



CE Полномочный  
представитель Qarad b.v.b.a.  
Volmolenheide 13  
B-2400 Mol, Belgium